

Dokumentegenskaber:	Version 1
Gældende for	Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi
Udarbejdet af	Dansk Otologisk Selskab. 01.04.14
Opdateringsdato	
Faglig ansvarlig	Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi
Nøgleord	Perioperativ antibiotisk behandling ved ørekirurgi

1. Titel

Generelle retningslinjer for perioperativ antibiotisk behandling ved mellemørekirurgi.

2. Formål

At beskrive evidensen for perioperativ antibiotika ved mellemørekirurgi.

3. Baggrund

Operationsfeltet er potentielt inficeret, med varierende karakteristika for det mikrobiologiske miljø. Der foreligger rimelige studier af systemisk medicinering og enkelte af lokal applikation.

4. Anbefaling

Der er ikke videnskabelig dokumentation for perioperativ antibiotisk behandling ved ørekirurgi. I særlige tilfælde hvor der skønnes at være øget risiko for infektiøse komplikationer (fx labyrint-blotning eller åbenlys infektion) kan antibiotisk behandling være indiceret.

5. Referencer

Antibiotic prophylaxis in clean and clean-contaminated ear surgery. Verschuur HP, de Wewer W and van Benthem PP. The Cochrane Library 20 JAN 2.

Perioperative Antibiotics for Otologic Surgery. Shin JJ, Hartnick CJ and Randolph GW. In Evidence – Based Otolaryngology, pp 383 – 408. Springer 2008.

Efficacy of perioperative ceftazidime in the surgical treatment of chronic otitis media due to P. Aeruginosa. Lildholdt T, Felding JU, Juul A, Kristensen S and Schouenborg P. Arch Otorhinolaryngol (1986) 243: 167-69.

6. Forfattere

Lildholdt, Andreas Agger og Peter Schousboe. Revideret af DOKS.