

ASA KLASSIFIKATION / DANSK OVERSÆTTELSE

	Definition	Udvalgte eksempler
ASA I	Rask patient.	Rask, ikke-ryger, intet eller minimalt alkoholforbrug (1).
ASA II	Mild systemisk sygdom.	Ingen funktionens indskrænkning. Ryger, alkoholindtag i social sammenhæng (2), gravid, svær overvægt (30<BMI<40), velbehandlet DM/HA/mild lungesygdom.
ASA III	Alvorlig systemisk sygdom.	Afgrænset funktionsnedsættelse. En eller flere betydende sygdomme: Dysreguleret DM eller HA, KOL, ekstrem svær overvægt (BMI > 40), aktiv hepatitis, alkoholafhængighed eller misbrug, implanteret pacemaker, moderat nedsat EF, kronisk dialyse, præmaturot barn og PCA < 60 uger. AMI, PCI-behandling, cerebralt insult, TCI eller trombolyse på cerebrale kar for mere end 3 måneder siden.
ASA IV	Alvorlig systemisk sygdom, som er konstant livstruende.	AMI, PCI-behandling, cerebralt insult, TCI eller trombolyse på cerebrale kar for mindre end 3 måneder siden. Symptomatisk iskæmisk hjertesygdom eller svær klapdysfunktion, svært nedsat EF, sepsis med tegn til påvirket organfunktion, DIC, ARDS eller kontinuerlig dialyse.
ASA V	Moribund patient, som ikke forventes at overleve uden operation.	Bristet abdominalt eller thorakalt aortaaneurisme, svære traumer, intrakraniell blødning med massevirkning, tarmiskæmi ved hjerte- eller multiorgansvigt.
ASA VI	Hjernedød organdonor.	

DASAIMs fortolkning: 1. Minimalt alkoholindtag svarer til SST's 7/14 genstande om ugen for hhv kvinder og mænd.
2. Alkoholindtag i social sammenhæng svarer til SST's 14/21 genstande om ugen for hhv kvinder og mænd.

FORKORTELSER:

BMI: Body Mass Index

DM: Diabetes Mellitus

HA: Hypertensio Arterialis

KOL: Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

EF: Ejection Fraction

AMI: Akut Myokardie Infarkt

PCI: Perkutan Coronar Intervention

PCA: PostConceptionel Age

TCI: Transitorisk Cerebral Iskæmi

DIC: Dissemineret Intravaskulær Coagulation

ARDS: Akut Respiratorisk Distress Syndrom

Oversat af DASAIMs anæstesiudvalg Oktober 2015