

Dokumentegenskaber:	Version 1
Gældende for	Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi
Udarbejdet af	Dansk Otologisk Selskab. 01.04.14
Opdateringsdato	01.10.19
Faglig ansvarlig	Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi
Nøgleord	Perioperativ antibiotisk behandling ved ørekirurgi

## 1. Titel

Generelle retningslinjer for perioperativ antibiotisk behandling ved mellemørekirurgi.

## 2. Formål

At beskrive evidensen for perioperativ antibiotika ved mellemørekirurgi.

## 3. Baggrund

Operationsfeltet er potentielt inficeret, med varierende karakteristika for det mikrobiologiske miljø. Der foreligger rimelige studier af systemisk medicinering og enkelte af lokal applikation.

## 4. Anbefaling

Der er ikke videnskabelig dokumentation for perioperativ antibiotisk behandling ved ørekirurgi. I særlige tilfælde hvor der skønnes at være øget risiko for infektionskomplikationer (for eksempel labyrinth-blotning eller åbenlys infektion) kan antibiotisk behandling være indiceret.

## 5. Referencer

Antibiotic prophylaxis in clean and clean-contaminated ear surgery. Verschuur HP, de Wewer W and van Benthem PP. The Cochrane Library 20 JAN 2. Perioperative Antibiotics for Otologic Surgery. Shin JJ, Hartnick CJ and Randolph GW.

In Evidence – Based Otolaryngology, pp 383 – 408. Springer 2008.

Efficacy of perioperative ceftazidime in the surgical treatment of chronic otitis

media due to P. Aeruginosa. Lildholdt T, Felding JU, Juul A, Kristensen S and Schouenborg P. Arch Otorhinolaryngol (1986) 243: 167-69.

**Forfattere**

Torben Lildholdt, Andreas Agger og Peter Schousboe.

Revideret af DOKS 2019